Klinikum
Mutterhaus
der Borromäerinnen

Syndrome de congestion pelvienne

Lorsque des veines pelviennes dilatées provoquent des douleurs chroniques

Douleurs au bas-ventre sans cause claire? Le syndrome de congestion pelvienne pourrait-il en être la cause?

Les douleurs pelviennes ou du bas-ventre chroniques peuvent avoir de nombreuses causes. L'une d'elles est le syndrome de congestion pelvienne. Le sang s'accumule alors dans les veines dilatées du bassin, ce qui peut entraîner une sensation de pression persistante et des douleurs.

Symptômes typiques

- Douleurs chroniques au bas-ventre ou au bassin
- Douleurs après une position assise ou debout prolongée
- Sensation de pression, douleurs après un rapport sexuel ou troubles liés au cycle menstruel

Qu'est-ce que l'embolisation dans le cas du syndrome de congestion pelvienne?

Les veines dilatées présentant un reflux pathologique sont obstruées de manière ciblée à l'aide d'un fin cathéter. Cela permet de réduire la congestion veineuse.

Une cause souvent négligée – traitable de manière mini-invasive.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

Calculez votre probabilité de souffrir du syndrome de congestion pelvienne (SCP) :

- Douleur au bas-ventre depuis plus de trois mois (3 points)
- Varices à l'entrée du vagin (2 points)
- Varices sur les jambes (2 points)
- Aggravation de la douleur (par ex. en position debout, lors des rapports sexuels ou des règles) (1 point)
- Un ou plusieurs accouchements (1 point)
- Maladies de l'utérus, des ovaires, de la vessie et des intestins improbables (1 point)

À partir de 6 points, un SCP est probable.

Comment se déroule le traitement?

Par un petit accès, généralement au niveau de l'aine ou du cou, un fin cathéter est introduit dans les veines concernées. Les veines dilatées sont ensuite obstruées avec des matériaux spécifiques.

Avantages potentiels

- Traitement ciblé des veines concernées
- Pas de chirurgie ouverte
- Traitement d'une cause de douleur souvent non diagnostiquée

Bon à savoir

Les douleurs pelviennes chroniques doivent faire l'objet d'un bilan approfondi. Toutes les douleurs pelviennes ne proviennent pas des veines. Le diagnostic repose généralement sur l'échographie, l'IRM ou le scanner, ainsi que sur une évaluation clinique ciblée.

Contact:
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
Radiologie diagnostique et interventionnelle
Feldstraße 16, 54290 Trèves, Allemagne
Tél.: +49 651 947-52354
Fax: +49 651 947-52373
E-mail: Intervention-Radiologie@mutterhaus.de

Éditeur: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Centre hospitalier universitaire de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence
Feldstraße 16 | 54290 Trèves | Tél. : +49 651 947-0 | info@mutterhaus.de
Direction: Dr. med. Christian Sprenger
Registre du commerce: Tribunal d'instance de Wittlich, HRB 40295
Mentions légales complètes: www.mutterhaus.de/impressum

En cas de doute, la version allemande fait foi.
Situation: Septembre 2026.

Accueil Radiologie (en allemand uniquement):

mutterhaus.de/fachabteilungen/radiologie