



Embolisation artérielle transartérielle

Nouvelle option mini-invasive pour les douleurs articulaires chroniques

Souffrez-vous de douleurs articulaires chroniques qui ne s'améliorent pas malgré la kinésithérapie ou les médicaments?

Les douleurs articulaires chroniques peuvent être intensifiées par l'arthrose, des états d'irritation ou des vaisseaux enflammés au niveau de l'articulation. Si la kinésithérapie, les médicaments ou les injections ne soulagent pas suffisamment, une embolisation ciblée peut être envisagée.

Symptômes typiques

- Douleurs articulaires chroniques (particulièrement genou, hanche, épaule) malgré un traitement conservateur
- Douleurs liées à l'effort
- État d'irritation, tendance au gonflement ou activité inflammatoire

Qu'est-ce que l'embolisation artérielle?

À l'aide d'un fin cathéter, les petites ramifications vasculaires présentant une hypervascularisation pathologique au niveau de l'articulation sont traitées de manière ciblée. L'objectif est de réduire la douleur et l'activité inflammatoire.

Mini-invasif. Guidé par imagerie de précision.

**N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER.**



À qui s'adresse cette méthode?

Pour les patients souffrant de douleurs chroniques à l'épaule, à la hanche ou au genou, en particulier en cas d'arthrose ou d'hypervascularisation inflammatoire, lorsque les mesures conservatrices ne suffisent pas ou qu'une opération doit être évitée.

Comment se déroule le traitement?


Par un petit accès, généralement au niveau de l'aîne ou du bras, un fin cathéter est introduit dans les vaisseaux de l'articulation concernée. Sous contrôle radiologique, les petites ramifications vasculaires suspectes sont embolisées de manière ciblée.

Avantages potentiels

- Approche préservant l'articulation
- Traitement ciblé des vaisseaux actifs sur le plan inflammatoire
- Option envisageable avant des interventions chirurgicales majeures

Bon à savoir

Cette méthode ne convient pas à toutes les formes de douleurs articulaires. Le type de symptômes, l'imagerie et le traitement orthopédique préalable sont des facteurs décisifs.



Contact:

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
Radiologie diagnostique et interventionnelle
Feldstraße 16, 54290 Trier (Trèves)
Tél.: +49 651 947-52354
Fax: +49 651 947-52373
E-mail: Intervention-Radiologie@mutterhaus.de

En cas de doute, la version
allemande fait foi.
Situation: Juin 2026.

Accueil Radiologie
(en allemand uniquement):

**mutterhaus.de/
fachabteilungen/
radiologie**

