

Klinik 11

**Tab. 4a: Kurzzeit-Morbidität - Vorjahr: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)
und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g**

| 2008 | | < 500 g | 500 - 749 g | 750 - 999 g | 1000 – 1249 g | 1250 – 1499 g | < 1500 g (Summe) |
|--|---|---------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|
| Gewichtsklasse | | | | | | | |
| Anzahl der Kinder | n | 1 | 12 | 6 | 9 | 22 | 50 |
| Nicht sonographiert | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Keine IVH | n | 1 | 9 | 4 | 8 | 18 | 40 |
| | % | 100,0% | 75,0% | 66,7% | 88,9% | 81,8% | 80,0% |
| IVH-Grad 1 | n | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | % | 0,0% | 8,3% | 16,7% | 11,1% | 13,6% | 12,0% |
| IVH-Grad 2 | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 2,0% |
| IVH-Grad 3 | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | % | 0,0% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
| IVH-Grad 4 | n | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | % | 0,0% | 8,3% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 4,0% |
| Fundus nicht untersucht* | n | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 22,2% | 18,2% | 12,0% |
| Retinopathie (ROP) mit Operation | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NEC mit Operation oder Verlegung | n | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | % | 0,0% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% |
| Entlassung nach Hause ohne IVH > Grad 2, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf** und ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP | n | 0 | 9 | 5 | 8 | 21 | 43 |
| | % | 0,0% | 75,0% | 83,3% | 88,9% | 95,5% | 86,0% |
| * keine ophthalmologische Untersuchung dokumentiert | | | | | | | |
| ** keine Sauerstoffgabe am Entlassungstag dokumentiert | | | | | | | |